

# PÍRCING I TATUATGE

- QUÈ CAL SABER.....

per evitar riscos



乔尔

## QUÈ CAL SABER ABANS?

- Que el lloc i professional triats són experts i prenen les mesures higièniques indispensables
- S'ha d'estar ben vacunat del tètanus
- Que hi ha llocs anatòmics amb més risc d'infecció i de mala cicatrització
- Que és millor no fer-se'ls a l'estiu per que la suor pot afavorir la infecció.
- Que si tens menys de 16 anys necessites autorització dels pares
- Que els tatuatges son difícils d'eliminar

乔尔

## RISC D'INFECCIONS

- Infeccions víriques: les més freqüents són pels virus de l'hepatitis B i C i el de la immunodeficiència humana (HIV)
- Infecció per bacteris presents a la pell humana, entre el 10-20% dels pírcings s'infecten per aquesta causa
- S'ha trobat algun cas d'infecció de tuberculosi i tètanus



# QUÈ AFAVOREIX LA INFECCIÓ?

- Manca d' higiene del tatuador
- Ús de materials de punció(agulles)no estèrils
- Desinfecció incorrecta de la pell o mucosa abans de fer el pírcing
- Manca de desinfecció o d' higiene durant la cicatrització de la ferida
- Tenir el pírcing en una localització que la afavoreixi : cartílag orella



# ALTRES REACCIONS ADVERSES

- Al·lèrgies als pigments o al material del pírcing
- Cicatritzacions anòmales
- Aparició de lesions secundaries :berrugues, herpes i altres afeccions de la pell

乔尔

## QUAN TRIGA A CICATRITZAR ?

- El pírcing pot trigar des de 3 setmanes (llengua) fins a 1 any ( cartílag orella)
- El tatuatge des de 5 dies ( braços ) fins a 18 dies ( abdomen)
- Les complicacions més greus acostumen a donar-se en els pírcings

*Mentre no hagi cicatritzat s´ han d´ extremar les mesures higièniques i la desinfecció*

乔尔

## QUÈ CAL FER DESPRÈS DEL TRACTAMENT ?

- Netejar-lo diàriament amb sèrum fisiològic i gasa estèril
- Mantenir seca la ferida
- No fregar la zona, ni aplicar cosmètics
- Evitar el sol, si es pren amb pantalla total
- Evitar piscines i platges els primers dies
- Consultar al metge si hi ha inflamació, supuració, febre