

Nom:

ASPIRINA® C efervescent BAYER

Composició

Cada comprimit conté: àcid acetilsalicílic, 400 mg; àcid ascòrbic, 240 mg. Excipients: bicarbonat sòdic, carbonat sòdic, sacarina 5 mg, citrat monosòdic, àcid cítric i altres.

Acció

L'àcid acetilsalicílic és eficaç com antipirètic i analgèsic. La vitamina C està indicada en la prevenció de les malalties per refredament, durant les quals és necessari un major aportament de la mateixa.

Indicacions

Tractament simptomàtic del dolor lleu o moderat i febre associats als estats gripals i refredat comú.

Posologia

Adults: 1-2 comprimits fins a 3-4 vegades al dia.

Nens de 6 a 12 anys: 1/2 a 1 comprimit fins a 3-4 vegades al dia.

Els comprimits es prenen dissolts en mig got d'aigua.

Contraindicacions i precaucions

Úlcera gastroduodenal o molèsties gàstriques de repetició; al·lèrgia a salicilats; hemofília o problemes de coagulació sanguínia. Insuficiència renal o hepàtica. La ingesta d'àcid acetilsalicílic, entre altres factors, s'ha relacionat amb la síndrome de Reye (i 2), malaltia molt poc freqüent però greu. Per això, es recomana consultar amb el metge abans d'administrar-lo a nens i a adolescents en casos de processos febrils, grip o varicel·la. Si es presenten vòmits o letargia (ensopiment) s'ha d'interrompre el tractament i consultar immediatament al metge.

Important per a la dona: si vostè està embarassada o pensa que ho pot estar, consulti al seu metge abans de prendre aquest medicament. El consum de medicaments durant l'embaràs pot ser perillós per a l'embrió o al fetus i ha de ser vigilat per el seu metge. No l'administreu com a preventiu de les possibles molèsties originades per les vacunacions.

Interaccions

L'àcid acetilsalicílic pot potenciar l'efecte dels anticoagulants orals i antidiabètics orals. No l'administreu amb fàrmacs potencialment ulcerogènics (com l'alcohol, entre d'altres).

Efectes secundaris

Erupcions cutànies; dificultat respiratòria; somnolència; vertigens.

Les dosis superiors a 1 g diari de vitamina C poden produir diarrea, càlculs renals i rampes abdominals.

Així mateix, existeix el risc de formació de càlculs i de precipitar atacs aguts de gota en individus predisposats.

Intoxicació i tractament

La símptomatologia de sobredosificació inclou cefalea, mareigs, xiulets a l'oïda, visió borrosa, somnolència, sudoració, vòmits, nàusees i de vegades, diarrees. El tractament és simptomàtic, incloent l'emesis (provocació de vòmits), el rentat gàstric i l'administració de carbó activat.

En cas de sobredosi o ingestió accidental, consulteu el Servei d'Informació Toxicològica. Telèfon: 91 562 04 20.

Presentació

Envàs amb 10 i 20 comprimits efervescents.

Sense recepta mèdica. Emmagatzemeu-lo en un lloc fresc i sec.

Els medicaments s'han de mantenir fora de l'abast dels nens.

Aclariment: l'anterior informació és una traducció del castellà adaptada del prospecte de l'Aspirina fabricada per QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER S.A. - Calabria, 268 - 08029 Barcelona



Qüestions

1. - Què és la posologia?
2. - Què són els excipients?
3. - Quin és el nom químic de la vitamina C?
4. - Què és una substància antipirètica? I, una substància analgèsica?
5. - Què és un tractament simptomàtic?
6. - Consulteu a la xarxa qui va ser el "pare" de l'aspirina, i també, qui va ser el primer fabricant espanyol d'aspirines i quan va començar aquesta tasca.
7. - Segons aquest web, quines són les noves aplicacions de l'aspirina?