

Nom:

Desenfriol - C® Granulat. Interpretació del prospecte d'un medicament.

Composició quantitativa

Associació analgèsica, antipirètica i antihistamínica per al tractament simptomàtic del refredat i les afeccions gripals. Cada sobre "monodosi" conté:

<i>clorfeniramina maleat</i>	2,0 mg
<i>àcid acetilsalicílic</i>	388,0 mg
<i>cafeïna</i>	32,4 mg
<i>àcid ascòrbic (vitamina C)</i>	500,0 mg
<i>sacarosa (excipient)</i>	4.265,0 mg
<i>altres excipients</i>	7,5 g

Propietats

El Desenfriol granulat associa l'acció antihistamínica (antial·lèrgica) de la clorfeniramina maleat amb l'analgèsica i antipirètica de l'àcid acetilsalicílic. La cafeïna contraresta l'estat depressiu que acompanya als refredats, mentre que la vitamina C té un efecte tònic general.

Indicacions

Tractament simptomàtic del refredat, dels estats gripals i dels estats catarrals.

Posologia

Adults: un sobre "monodosi" cada 4-6 hores. No s'ha de sobrepassar la quantitat de 7 sobres per dia.

Nens: no es recomanable l'administració a menors de 6 anys. Entre 6 i 12 anys, la dosi recomanable és de 1/2 sobre cada 4-6 hores, no excedint els 3 sobres per dia.

Ús

Dissoldre el contingut d'un sobre en un got amb 100-200 ml d'aigua. Una vegada dissolt, s'haurà d'ingerir tota la solució, evitant la conservació i la posterior administració.

Contraindicacions

Contraindicat en pacients hipersensibles a alguns dels components de la fórmula.

Interaccions i precaucions

No es recomana la ingestió conjunta amb begudes alcohòliques. No és convenient fer-ne un ús superior als 10 dies sense control mèdic. S'ha d'anar en compte en pacients amb asma, malalties cardiovasculars greus i en les persones grans. Tampoc ha estat establerta la seguretat d'aquest producte en l'embaràs.

Intoxicació i el seu tractament

La simptomatologia de sobredosificació inclou cefalees, xiulets a l'oïda, somnolència, vòmits, secreció de la suor, nàusees i de vegades, diarrees.

Presentació

Capsa amb 10 sobres monodosi.

- Sense recepta mèdica.
- Els medicaments s'han de mantenir fora de l'abast dels nens.
- Important per a la dona: si vostè està embarassada o pensa que ho pot estar, consulti al seu metge abans de prendre aquest medicament. El consum de medicaments durant l'embaràs pot ser perillós per a l'embrió o al fetus i ha de ser vigilat per el seu metge.

L'anterior informació és una traducció simplificada d'un prospecte de medicament real fabricat per "Laboratorios Schering-Plough, S.A. - Km. 36 N - I, San Agustín de Guadalix (Madrid)"

A continuació s'indiquen "sis punts fonamentals" sobre la grip i el refredat que figuraven en el mateix prospecte:

GRIPE Y RESFRIADO

1. Se debe a muchas causas

Son infecciones que pueden ser causadas por cualquiera de unos 150 virus distintos, y afecta los ojos, los oídos, la nariz y la garganta.

2. La gripe y el resfriado no se curan

El virus debe seguir su curso. Sin embargo, usted puede aliviar los síntomas permitiéndole seguir con su ritmo de vida habitual.

3. Se transmiten de una persona a otra

El virus se transmite por contacto directo o a través de la atmósfera. El viento, el frío o la humedad no causan por sí solos estas afecciones.

4. El tratamiento incluye: descanso, consumo de líquidos, nutrición adecuada, aislamiento del enfermo

Los medicamentos (analgésicos, antihistamínicos, etc.) pueden aliviar los **síntomas** (estado febril, dolores musculares, congestión, malestar general). Pero el tiempo (generalmente una semana) es la única curación segura.

5. Los síntomas pueden ser confusos

A veces los síntomas se confunden con los de alergias o infecciones bacterianas. El diagnóstico adecuado es fundamental. Consulte con su médico o farmacéutico.

6. Si estas enfermedades no son tratadas pueden acarrear complicaciones

Trate los síntomas para evitar complicaciones causadas por obstrucción de las vías respiratorias e infecciones bacterianas secundarias. En ese caso estas complicaciones deberán ser tratadas de distinta manera (antibióticos, etc.)

Información por cortesía de Shering-Plough S. A.

Questions:

1. Quins són els principis actius d'aquest medicament?
2. En 10 g de granulat de Desenfriol, quina quantitat hi ha d'excipients? I, de principis actius?
3. Quina és la quantitat màxima diària d'aquest medicament que pot prendre una persona adulta? I, un nen o una nena de cinc anys?
4. En quins casos cal consultar al metge abans de prendre aquest medicament?
5. Per quins motius creus que els farmacèutics i metges de Shering-Plough S.A. diuen que la grip i els refredats no es curen?
6. Què són infeccions bacterianes secundàries?